


EDHYA COLOSTART

Colostrum pour poulain



ALIMENT COMPLÉMENTAIRE EN PÂTE POUR POULAIN

COMPOSITION

Levure de bière spray (*Saccharomyces cerevisiae*), colostrum (IBR négatif), vinaigre de cidre, plantes microfinées (Pissenlit, Ortie, Artichaut, Chardon marie, Verge d'Or, Épine vinette, Prêle, Aubépine, Bugrane, Radis noir, Fumeterre, Boldo, Cassis, Orthosiphon), Algues marines, Hydrolysate de poisson, Huile de germe de blé, Huile d'avocat, Sorbitol, Lactate et gluconate de calcium.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéines brutes	17,0 %
Cellulose brute	5,0 %
Cendres brutes	3,0 %
Matières grasses brutes	11,0 %
Humidité	28,0 %
Magnésium	0,06 %
Sodium	0,11%

CONSERVATION

Stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière

CONDITIONNEMENTS

Seringues de 30 ml

INDICATIONS

- Apport complémentaire de colostrum
- Soutien des défenses immunitaires
- Vitalité
- Soutien digestif
- Développement du poulain
- Poulain orphelin
- Poulain chétif

ADDITIFS AU KG BRUT

Vitamines

- Vit. A (3a672a) : 1 300 000 UI - Vit. D3 (3a671) : 30 000 UI -
- Vit. K (3a710) : 200 mg - Vit. E (3a700) : 2 900 UI -
- Vit. C (3a 300) : 17 000 mg - Vit. B1 (3a 820) : 600mg -
- Vit. B2 (3A825) : 480 mg - Vit. B12 (3a 835) : 10 mg.

Oligo-éléments

- Fer (3b108) : 40 mg
- Zinc (3b607) : 250 mg
- Cuivre (3b413) : 50 mg
- Manganèse (3b506) : 100 mg
- Sélénium (3b802) : 50 mg
- Sélénium organique (3b810) : 10mg
- Cobalt (3b301) : 100 mg
- Iode (3b201) : 70 mg

MODE D'EMPLOI

Poulain :

1 seringue dans les 6h après la naissance.
Renouveler à 24h si manque de vitalité ou poulain orphelin.

Conseils

- À 12 h et 48 h, distribuer 1 seringue d'Edhya OLIGO'SPYR FOAL (vitalité)
- À 24 h, 72 h et 7 jours, distribuer 20 ml de FLOR'Edhya (soutien digestif)
- À distribuer en complément d'un colostrum frais ou congelé issu d'une jument.

Agent émulsifiant

Propylène glycol (E490), Polysorbate (E432)