

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DIÉTÉTIQUE EN GRANULÉS POUR CHEVAUX

COMPOSITION

Spiruline, Carbonate de calcium, Remoulage de blé, Graines de soja extrudées, Sels calciques d'acides gras d'huile de colza, Levures Saccharomyces cerevisiae inactivées.

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéines brutes	37.2 %
Matières grasses brutes	6.5 %
Cellulose brute	1.6 %
Cendres brutes	25.2 %
Calcium	7.7 %
Sodium	0.2 %

CONSERVATION

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

ADDITIFS AU KG BRUT

Oligo-éléments
- Zinc (Chélate de zinc et de glycine hydraté) (3b607) : 18 000 mg/kg
- Cuivre (chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté) (3b413) : 4 800 mg/kg

Vitamines
- D-pantothénate de calcium (3a841) : 1 000 mg/kg
- Vitamine B6 (3a831) : 1 000 mg/kg
- Biotine (3a880) : 2 000 mg/kg

Acides aminés
- DL-méthionine, techniquement pure (3c301) : 150 000 mg/kg

Agents conservateurs
- Acide citrique (1a330) : 499 mg/kg
- Acide sorbique (sorbate de potassium) (1k202) : 373 mg/kg

Substances aromatiques
Mélange de substances aromatiques
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté (2b920) : 80 000 mg/kg

CONDITIONNEMENT

Pot de 1 kg et sac de 25 kg

EDHYA BIOTINE ULTRA

Résistance du sabot et beauté des phanères

Edhya BIOTINE ULTRA est développé pour soutenir efficacement la pousse et la résistance du sabot, ainsi que la qualité et la croissance du poil et des crins.
Chez le cheval, la pousse de la corne s'effectue au niveau de la couronne (bourrelet périoplique), à la jonction entre la peau et le sabot. Cette matrice génère en continu des cellules de la corne pour former une structure tubulaire de kératine, essentielle à la structure du pied. La kératine est le constituant majeur de l'ensemble des phanères (sabots, crins, poils, vibrisses).

• Edhya BIOTINE ULTRA favorise une pousse plus rapide des sabots et des phanères.
Il est démontré que la supplémentation en biotine permet d'augmenter la croissance de la corne. Elle joue le rôle d'activateur de la multiplication cellulaire au niveau du bourrelet périoplique, stimulant la synthèse de kératine.
Les vitamines B5 et B6 soutiennent le métabolisme des acides aminés, le renouvellement cellulaire et la production des protéines qui forment la kératine.
La spiruline est naturellement riche en protéines et en acides aminés essentiels (lysine, méthionine, cystéine). Associée à la levure, elles participent à l'apport des nutriments nécessaires à la synthèse et au renouvellement des tissus kératinisés.
La couronne est une structure très vascularisée qui a besoin d'une bonne oxygénation pour assurer la pousse du sabot. La phycocyanine contenue dans la spiruline contribue au maintien d'une bonne teneur en globules rouges dans le sang. Ce phénomène favorise une amélioration du transport de dioxygène, permettant ainsi une meilleure oxygénation des tissus.

• Edhya BIOTINE ULTRA contribue à améliorer la qualité et la résistance des phanères.
La supplémentation en biotine participe à renforcer la dureté de la paroi du sabot, à stopper l'effritement et à recombler les fissures sur le pied. Chez les chevaux ferrés, elle contribue également à une meilleure tenue de la ferrure.
Les ponts disulfures formés entre les acides aminés (méthionine et cystéine) contribuent à la stabilité du réseau de fibres de kératine. Ils soutiennent les propriétés mécaniques de la corne (résistance, élasticité).
Edhya BIOTINE ULTRA contient 100% de zinc et de cuivre sous forme chélatée (la forme la plus assimilable). Ces oligo-éléments contribuent à souder entre eux les tubes de kératines qui forment le sabot. Il aussi est démontré que l'apport de zinc et de cuivre favorise l'élasticité et la résistance des phanères.

EDHYA BIOTINE ULTRA intègre l'ensemble des nutriments en quantités optimales pour un bon soutien efficace du pied.
Grâce à sa concentration, 20 g/jour de Edhya BIOTINE ULTRA apporte l'équivalent de 40 mg de biotine.
Sa granulation à basse température permet de préserver les ingrédients fragiles de sa formule.

INDICATIONS

- Qualité et la croissance des sabots,
- Sabots abîmés (seimes, fourmilières),
- Pousse insuffisante du sabot,
- Beauté du poil et des crins.

MODE D'EMPLOI

Distribuer dans la nourriture, en une fois. 1 doseur = 20 g.

Chevaux adultes
20 g / jour pendant au minimum 50 jours.